

**PRODUKT
POLSKI**

Bio ActiW[®] Vet
Professional



PLYN DO DEZYNFEKCJI

SKÓRY, SIERŚCI, WODY DO PICIA, POWIERZCHNI W OBSZARZE WETERYNARYJNYM

KONCENTRAT



Zabija
99,99%
bakterii
i wirusów



100%
bio-
degradowalny



PRODUKT Z ATESTEM
ŚWIADCTWO JAKOŚCI
ZDROWOTNEJ
B-BZ-6071-02/20/G



PRODUKT Z ATESTEM
ATEST HIGIENICZNY
BBK602100825/20



100%
z naturalnych
składników



Przebadany
dermatolo-
gicznie



koncentrat



produkt gotowy do użycia

Podmiot odpowiedzialny: BIO ACTIW sp. z o.o. www.bioactiw.pl

Bio ActiW[®] Vet Professional

KWAS PODCHLOROWY SIŁA LUDZKIEGO I ZWIĘZĘCEGO UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO

Bio ActiW Vet Professional zawiera ultraczysty kwas podchlorawy, substancję, która jest naturalnie wytwarzana w białych ciałkach krwi ludzi i zwierząt. Kwas podchlorawy jest ważnym składnikiem systemu odpornościowego (immunologicznego) ludzi i zwierząt. Bierze udział w ochronie organizmu przed atakiem chorobotwórczych bakterii, wirusów i grzybów.

Bio ActiW Vet Professional wykazuje działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze oraz wirusobójcze (w tym wobec wirusa ASF)

Zastosowanie:

- Dezynfekcja skóry, sierści, wymion
- Dezynfekcja powierzchni mających i nie mających kontakt z żywnością
- Dezynfekcja powierzchni nieporowatych, przedmiotów mających związek z pobytem lub transportem zwierząt w celu utrzymania higieny weterynaryjnej, w tym również do dezynfekcji gabinetów weterynaryjnych
- Dezynfekcja wody przeznaczonej do picia dla zwierząt
- Dezynfekcja linii pojenia

Bio ActiW VET jest:

- Całkowicie (w 100%) biodegradowalny
- nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt (w tym pszczoł) i środowiska naturalnego
- Jeden z najskuteczniejszych obecnie znanych środków biobójczych
- Eliminuje biofilm
- Mikroorganizmy nie tworzą odporności na kwas podchlorawy, tak jak w przypadku antybiotyków
- Posiada Atest Higieniczny PZH do wody pitnej
- Posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH do powierzchni
- Może być bezpiecznie usuwany z wody w systemach kanalizacyjnych w czystej postaci
- Hipoalergiczny, bezpieczny - nie powoduje poparzeń, nie wymaga środków ochrony osobistej
- Może być używany do dezynfekcji pomieszczeń i zwierząt poprzez zamgławianie

Bio ActiW[®] Vet Professional

Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami laboratoryjnymi:

Działanie bakterio, drożdżakobójcze i wirusobójcze, w tym wobec wirusa ASF

- **Zwalcza bakterie: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus hauseri, Enterococcus hirae;** (redukcja: 4,0 log = 99,99%). Przy stężeniu 400 ppm (20% roztwór produktu Bio ActiW VET Professional) w czasie 30 minut, badania wykonane wg normy: PN-EN 14349:2013-05 (obszar weterynaryjny)
- **Zwalcza bakterie: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus uberis,** wymagane dla preparatów do dezynfekcji skóry i wymion przed udojem przy stężeniu 400 ppm (20% roztwór produktu Bio ActiW VET Professional) (redukcja 5,0 log = 99,999%) w czasie 3 minut, wg normy: PN-EN PN-EN 1656:2020-01 (obszar weterynaryjny)
- **Zwalcza bakterie: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus uberis,** wymagane dla preparatów do dezynfekcji wymion po udoju przy stężeniu 400 ppm (20% roztwór produktu Bio ActiW VET Professional) (redukcja 5,0 log = 99,999%) w czasie 3 minut, wg normy: PN-EN PN-EN 1656:2020-01 (obszar weterynaryjny)
- **Zwalcza bakterie i grzyby drożdżopodobne na powierzchni: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Listeria monocytogenes, Salmonella enterica; Candida albicans;** (redukcja: 6,0 log = 99,9999%) w czasie 15 minut, przy stężeniu substancji czynnej: (200 ppm), to jest 10% roztwór produktu Bio ActiW VET Professional: badania wykonane według normy: PN-EN 13697 + A1:2019-08,
- **Zwalcza bakterie: Legionella pneumophila:** (redukcja: 5,0 log = 99,999%) w czasie 60 minut, przy stężeniu substancji czynnej: 50 ppm, (2,5% roztwór produktu Bio ActiW VET Professional): ilościowa zawieszinowa metoda wg normy: PN-EN 1276:2019
- **Zwalcza bakterie oraz drożdże: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Candida albicans;** (redukcja: 6,0 log = 99,9999% w czasie 15 minut, przy stężeniu substancji czynnej: 200 ppm (10% roztwór produktu Bio ActiW VET Professional), wg normy: PN-EN 1276:2019
- Zwalcza Mycobacterium terreum oraz Mycobacterium avium, (redukcja >6,0 log = 99,9999%) w czasie 5 minut, przy stężeniu substancji czynnej: 300 ppm (15% roztwór produktu Bio ActiW VET Professional). Badania wykonane według EN:PN 14348:2006 w Zakładzie Mikrobiologii, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
- **Zwalcza wirusa ASF** w warunkach czystych i brudnych (redukcja: 4,0 log = 99,99%) przy stężeniu 200 ppm (10% stężenie produktu Bio ActiW VET Professional). Badania wykonane w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach według ZCHS/PB-83
- **Zwalcza Enterowirus bydłowy** w warunkach czystych (redukcja: 4,0 log = 99,99%) przy stężeniu 400 ppm (20% stężenie produktu Bio ActiW VET Professional). Badania wykonane w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach według ZCHS/PB-83

Dezynfekcja poprzez zamgławianie: działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze

- **Zwalcza: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae, Enterococcus faecium, Acinetobacter baumannii, Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae, Aspergillus brasiliensis, Candida albicans** (redukcja: 5,0 log = 99,999%)
- **Zwalcza wirusy: Human coronavirus 229E, Poliovirus, Murine norovirus, Adenovirus, Vaccinia virus** (redukcja: 6,0 log = 99,9999%) w czasie 60 minut oraz zużycia 0,02 litra produktu /1 m³ - zastosowane stężenie: 300 ppm (15% roztwór produktu Bio ActiW VET Professional: badania wykonane według normy: EN 17272:2019 (dezynfekcja poprzez zamgławianie) - dezynfekcja suchą mgłą

BADANIA NAUKOWE



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”



Działanie 16 „Współpraca” Projekt realizowany jest w latach 2021-2022, w konsorcjum o nazwie:

GRUPA OPERACYJNA: ZDROWA ŻYWNOSĆ

którą tworzą: BIO ACTIW sp. z o.o. oraz Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie



UNIWERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie


Tytuł operacji: Wykorzystanie wody elektrolizowanej (kwasu podchlorawego) w produkcji roślinnej i zwierzęcej jako środka innowacyjnego, bezpiecznego i ograniczającego stosowanie szkodliwych związków chemicznych, pestycydów i antybiotyków w rolnictwie.

Celem Operacji jest opracowanie technologii:

- Ochrony roślin przed chorobami przy użyciu wody elektrolizowanej (kwas podchlorawy)
- Podniesienia zdrowotności zwierząt hodowlanych i ograniczenia stosowania antybiotyków dzięki zastosowaniu wody elektrolizowanej (kwasu podchlorawego) w ograniczaniu chorób przewodu pokarmowego, dezynfekcji wymion krów, poprawy warunków zdrowotnych bytowania zwierząt poprzez bezpieczną dezynfekcję pomieszczeń,
- Dezynfekcji jaj wylęgowych za pomocą elektrolizowanej wody (kwasu podchlorawego), w celu wyeliminowania formaldehydu.

Wyniki badań z projektu „Zdrowa Żywność” można będzie znaleźć na stronie:

<https://zdrowazywnosc.bioactiv.pl/>



ZASTOSOWANIE PRODUKTU W HODOWLI DROBIU

ZASTOSOWANIE	Stężenie	Uwagi
Dezynfekcja kurnika pomiędzy rzutami poprzez zamgławianie suchą mgłą	20% roztwór (2 litry Bio ActiW vet Professional + 8 litrów wody destylowanej)	Zastosowanie po procesie mycia: - dezynfekcja za pomocą zamgławiania suchą mgłą: Ilość roztworu: 0,02 litra/1 m ³ (2 litry/100 m ³) Po zamgławianiu należy pozostawić zamknięte pomieszczenie na 5-6 godzin - nie jest wymagane wietrzenie Można przebywać w zamgławianym pomieszczeniu ale nie dłużej niż 15 minut
Dezynfekcja słomy/torfu wstawionej do kurnika poprzez zamgławianie suchą mgłą	20% roztwór (2 litry Bio ActiW VET Professional + 8 litrów wody destylowanej)	Zastosowanie po procesie mycia: - dezynfekcja za pomocą zamgławiania suchą mgłą: Ilość roztworu: 0,02 litra/1 m ³ (2 litry/100 m ³) Po zamgławianiu należy pozostawić zamknięte pomieszczenie na 5-6 godzin - nie jest wymagane wietrzenie Można przebywać w zamgławianym pomieszczeniu ale nie dłużej niż 15 minut
Dezynfekcja kurnika w trakcie cyklu produkcyjnego przy użyciu zamgławiania suchą mgłą	15% roztwór (1,5 litra Bio ActiW VET Professional + 8,5 litrów wody destylowanej)	Zastosowanie w okresie ciemności, lub wczesnym rankiem: Ilość roztworu konieczna na wielkość pomieszczenia: 0,01 litra/1 m ³ (1 litra/100 m ³). Należy wyłączyć wentylację na okres 1 godziny. Należy stosować 3 razy w tygodniu, począwszy od 2 dnia od wstawienia piskląt. Cykliczne stosowanie pozwala ograniczyć problemy chorobowe z górnymi drogami oddechowymi, z E. coli, salmonella, gronkowcem, itp. oraz ograniczyć poziom emisji odoru z odchodów (rozkład amoniaku do chloramin oraz rozkład siarkowodoru do wielosiarczków).
Dezynfekcja systemu pojenia w obecności zwierząt	0,5% roztwór (0,5 litra Bio ActiW VET Professional + 99,5 litrów wody)	1) Zaleca się zastosowanie 2 dni zaraz po wstawieniu piskląt a następnie profilaktycznie co 7-10 dni przez 1 dzień 2) W okresie pojawienia się chorób przewodu pokarmowego zwierząt. Zaleca się podawanie przez 1-2 dni. Po tym okresie zaleca się podanie probiotyku
Dezynfekcja systemu pojenia podczas przerwy produkcyjnej (usuwanie biofilmu)	1,5% roztwór (1,5 litra Bio ActiW VET Professional + 98,5 litra wody)	Napełnić instalację roztworem i pozostawić na 5-7 godzin. Następnie przepłukać
Dezynfekcja skóry/piór	20% roztwór (2 litry Bio ActiW VET Professional + 8 litrów wody)	Należy dokładnie spryskać. Pozostawić do wyschnięcia
Dezynfekcja narzędzi, wiader, itp. metodą natryskową	10% roztwór (1 litr Bio ActiW vet Professional + 9 litrów wody)	Spryskać, lub umyć. Pozostawić do wyschnięcia. Nie wymaga sputkiwania
Maty dezynfekcyjne	20% roztwór (2 litry Bio ActiW VET Professional + 8 litrów wody)	Należy wymieniać roztwór co 4-5 dni